



250 g



آمپرولیوم ۲۰٪

آمپرودیسول®

ضد کوکسیدیوز سنتتیک/ پودر محلول در آب

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

آمپرولیوم هیدروکلراید ۲۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: آمپرولیوم از لحاظ شکل ساختمانی مشابه تیامین (ویتامین B1) بوده و بصورت آنتاگونیست رقابتی مانع از انتقال فعال تیامین در سیکل حیاتی آیمریاها شده و در نتیجه تیامین در دسترس کوکسیدیایها قرار نمی‌گیرد. آمپرولیوم با اثر بر روی نسل اول شیزونت‌ها در سلول‌های جدار روده و جلوگیری از تمایز مروژوئیت‌ها اوج فعالیت خود را در سه روز اول چرخه زندگی آیمریا نشان می‌دهد. این دارو همچنین ممکن است باعث متوقف کردن مراحل جنسی و هاگ گذاری اووسیت‌ها گردد. آمپرولیوم بر علیه گونه‌های آیمریا بخصوص آیمریا تنلا، آیمریا نکاتریکس و برخی از سوبه‌های آیمریا آسرویلینا موثر است.

موارد مصرف: آمپرولیوم جهت پیشگیری و درمان بیماری کوکسیدیوز طیور (گوشتی، تخم‌گذار، مادر) و بوقلمون، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد منع مصرف: در مرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:

پیشگیری: ۱۰۰ گرم دارو در ۳۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۱-۲ هفته.
درمان: ۱۰۰ گرم دارو در ۸۰-۱۶۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۷ روز.

توجه:

مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول درمانی بایستی به صورت تازه روزانه تهیه و در عرض ۲۴ ساعت مصرف شود. در طول دوره درمان باید تنها منبع آب آشامیدنی، آب حاوی دارو باشد.

میزان دوز مصرفی محلول‌های خوراکی یا پودرهای محلول در آب بسته به میزان آب مصرفی می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای محیط (در فصول مختلف گرم و سرد)، محتوای نمک در غذا، وضعیت سلامت گله، تراکم، کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

تداخل دارویی: آمپرولیوم با ویتامین‌ها (به استثناء ویتامین B1)، مواد معدنی، آنتی‌بیوتیک‌ها و سایر محتویات جیره غذایی که در صنعت طیور استفاده می‌شود ناسازگاری ندارد. ولی در جیره ای که حاوی مقادیر بالای کولین کلراید باشد، به دلیل تشکیل اسیدیپکریک نباید مصرف شود.

عوارض جانبی: درمان طولانی مدت با مقادیر بیش از حد توصیه شده آمپرودیسول® ممکن است منجر به تاخیر رشد و یا پلی‌نوریت در جوجه های گوشتی شده و همچنین می‌تواند کمبود ویتامین B1 را در میزبان ایجاد کند. توصیه می‌شود که در صورت کمبود ویتامین B1، این ویتامین به صورت خوراکی تجویز شود. به دلیل شباهت ساختمانی آمپرولیوم با تیامین، بالا بودن میزان تیامین جیره غذایی می‌تواند باعث کاهش اثر دارو شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام تهیه محلول، حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس آمپرودیسول® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: ساشه آلومینیومی ۲۵۰ گرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)