



# کلر تتراسایکلین ۵۰٪

## کلومیکس<sup>®</sup> ۵۰

### آنتی باکتریال / پودر مخلوط در دان

**ترکیب:** هر کیلوگرم حاوی:

کلر تتراسایکلین هیدروکلراید ..... ۵۰۰ گرم  
مواد حامل و جانبی تا ..... ۱۰۰۰ گرم

**گونه هدف:** طیور

**مکانیسم اثر:** این دارو متعلق به گروه تتراسایکلین‌ها و یک آنتی باکتریال باکتریواستاتیک است که بر روی تعداد زیادی باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی گرم مثبت و گرم منفی و همچنین کلامیدها، مایکوپلاسماها، ریکتزیا و برخی پروتوزوآها اثر می‌گذارد. کلر تتراسایکلین سنتز پروتئین در باکتری را به وسیله باندشدن باریبوزوم‌های باکتریایی مهار می‌کند.

**موارد مصرف:** کلومیکس<sup>®</sup> ۵۰ جهت کنترل و درمان عفونت‌های تنفسی و سیستمیک ناشی از ارگانیزم‌های حساس به تتراسایکلین‌ها در طیور و بوقلمون به کار می‌رود.

**موارد منع مصرف:**

در موارد حساسیت به کلر تتراسایکلین و نارسایی کبدی و کلیوی استفاده نگردد. در مرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود.

**میزان و نحوه مصرف:**

از طریق خوراکی و مخلوط در دان تجویز می‌شود.  
**طیور:** ۲۰-۳۰ میلی‌گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و یا ۶۰۰-۸۰۰ گرم پرمیکس کلومیکس<sup>®</sup> ۵۰ در یک تن خوراک (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)  
**بوقلمون:** ۵۰۰-۸۰۰ گرم پرمیکس کلومیکس<sup>®</sup> ۵۰ در یک تن خوراک (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

**توجه:** مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

**تداخل دارویی:** از مصرف کلومیکس<sup>®</sup> ۵۰ همراه با آنتی‌بیوتیک

های باکتریوسیدال مثل: پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها و ... خودداری شود.

مصرف کاتیون‌ها مانند: منیزیم، منگنز، آهن و آلومینیوم با گروه تتراسایکلین‌ها به دلیل تشکیل شلاته، باعث کاهش اثر آنها می‌شود.

**زمان پرهیز از مصرف:** ۷ روز قبل از کشتار

**موارد احتیاط:** این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس کلومیکس<sup>®</sup> ۵۰ با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

**شرایط نگهداری:** در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

**مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید

**بسته بندی:** فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)