



## انروفلوکساسین ۱۰٪ انروفارما®

آنتی باکتریال / محلول خوراکی

**ترکیب:** هر لیتر حاوی:

انروفلوکساسین ..... ۱۰۰ گرم  
مواد حامل و جانی تا ..... ۱ لیتر

**گونه هدف:** طيور

**مکانیسم اثر:** انروفلوکساسین یک آنتی‌بیوتیک سنتتیک وسیع الطیف و باکتریسیدال از گروه کینولون‌ها است و موجب مهار فعالیت آنزیم DNA-gyrase می‌شود. درصد زنده ماندن ارگانیزم‌های حساس به انروفلوکساسین معمولاً در عرض ۲۰-۳۰ دقیقه پس از قرار گرفتن در معرض غلظت موثر با از دست دادن خاصیت باکتریایی خود کم می‌شود و در برابر طیف وسیعی از باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت و همچنین مایکوپلاسماها مؤثر است.

**موارد مصرف:** انروفارما® به منظور کنترل و درمان بیماری‌های دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری - تناسلی طیور که توسط باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی و یا با منشاء مایکوپلاسماها مانند: CRD، مایکوپلاسموزیس، پاستورلوز (وبای مرغان)، تیفوئید مرغان، بیماری شبه حصبه، عفونت‌هایی با منشاء اشرشیاکلی، کلی باسیلوز، آکتینوباسیلوز، سالمونلوز، بروسلوز، عفونت استافیلوکوکی و استرپتوکوکی، عفونت ثانویه باکتریایی متعاقب عفونت‌های ویروسی و ... از طریق آب آشامیدنی مصرف می‌شود.

**موارد منع مصرف:** این دارو نباید در موارد حساسیت به انروفلوکساسین مصرف شود. در مرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آنها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود.

**میزان و نحوه مصرف:**

۱۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز (معادل ۵۰۰ میلی‌لیتر انروفارما® در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی) به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی.

**توجه:**

مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول درمانی بایستی به صورت تازه روزانه تهیه و در عرض ۲۴ ساعت مصرف شود. در طول دوره درمان باید تنها منبع آب آشامیدنی آب حاوی دارو باشد. پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۳۰ روز مصرف گردد. میزان دوز مصرفی محلول‌های خوراکی یا پودرهای محلول در آب بسته به میزان آب مصرفی می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای محیط (در فصول مختلف گرم و سرد)، محتوای نمک در غذا، وضعیت سلامت گله، تراکم، کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

**تداخل دارویی:** از استفاده همزمان با داروهای کلرآمفنیکل، ماکرولیدها و تتراسایکلین‌ها و آمینوگلیکوزیدها پرهیز شود.

مواد حاوی منیزیم و آلومینیوم ممکن است در جذب انروفلوکساسین از دستگاه گوارشی اختلال ایجاد کنند.

**زمان پرهیز از مصرف:** حداقل ۸ روز قبل از کشتار.

**موارد احتیاط:** این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام تهیه محلول حتماً از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید. در صورت تماس انروفارما® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

**شرایط نگهداری:** در مکان خشک و خنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

**مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید.

**بسته بندی:** بطری‌های پلی‌اتیلنی یک لیتری.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)