



اریترومایسین ۲۰٪

# اریتروفارما®

آنتی باکتریال / پودر محلول در آب

**ترکیب:** هر کیلوگرم حاوی:

اریترومایسین (ملح تیوسیانات) ..... ۲۰۰ گرم  
مواد حامل و جانی تا ..... ۱۰۰۰ گرم

## گونه هدف: طيور

**مکانیسم اثر:** اریترومایسین یک آنتی‌بیوتیک باکتریواستاتیک متعلق به گروه ماکرولیدها بوده که به طور برگشت‌پذیر با اتصال به زیر واحد ریبوزوم 50S منجر به اختلال و مهار سنتز پروتئین شده و رشد سلول باکتری را مهار می‌کند.

## موارد مصرف:

**اریتروفارما®** برای درمان بیماری مزمن تنفسی (CRD) ناشی از عفونت‌های مایکوپلازما و سایر بیماری‌های ناشی از باکتری‌های حساس به اریترومایسین مانند استافیلوکوکوس اورئوس (آرتربت عفونی)، هموفیلوس پاراگالیناروم (کوریزا عفونی) و پاستورلا مولتی سیدا (پاستورلوز و پنومونی) در طیور به‌کار می‌رود.

## موارد منع مصرف:

این دارو نباید در موارد حساسیت به اریترومایسین مصرف شود. در حیوانات با نارسایی کبدی و کلیوی شدید تجویز نگردد. در مرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود.

## میزان و نحوه مصرف:

۱۰۰۰ گرم در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳-۵ روز متوالی.  
۲۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه به مدت ۳-۵ روز متوالی.

## توجه:

مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد. محلول درمانی بایستی بصورت تازه روزانه تهیه و تا ۲۴ ساعت مصرف گردد. در طول دوره درمان باید تنها منبع آب آشامیدنی آب حاوی دارو باشد.

پیشنهاد می‌گردد که ابتدا یک محلول اولیه بر اساس دوز توصیه شده در ۲۰ لیتر آب آشامیدنی تهیه گردد و سپس این محلول را به آب آشامیدنی نهایی اضافه نمایید.

میزان دوز مصرفی محلول‌های خوراکی یا پودرهای محلول در آب بسته به میزان آب مصرفی می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای محیط (در فصول مختلف گرم و سرد)، محتوای نمک در غذا، وضعیت سلامت گله، تراکم، کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

## تداخل دارویی:

از مصرف همزمان با تتراسایکلین، کلرآمفیکل، لینکومایسین و سایر ماکرولیدها خودداری گردد.

## زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل از کشتار.

**موارد احتیاط:** این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام تهیه محلول حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید و در صورت تماس تصادفی اریتروفارما® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو دهید.

**شرایط نگهداری:** در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

**مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید

**بسته بندی:** ساشه آلومینیومی ۵۰۰ گرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)