



تایلوژین فسفات ۲۵٪

نیازوفید®

آنتی باکتریال / پودر مخلوط در دان

**ترکیب:** هر کیلوگرم حاوی:

تایلوژین فعال (بصورت تایلوژین فسفات) ..... ۲۵۰ گرم  
مواد حامل و جانبی تا ..... ۱۰۰۰ گرم

**گونه هدف:** طیور

**مکانیسم اثر:** تایلوژین یک آنتی‌بیوتیک ماکرولیدی و دارای خاصیت باکتری‌استاتیک است که از تخمیر نوعی قارچ به نام استرپتومایسس فرادیا بدست می‌آید. تایلوژین اثر ضد میکروبی خود را با مهار سنتز پروتئین‌ها در میکروارگانیسم‌های حساس انجام می‌دهد. طیف اثر آن شامل باکتری‌های گرم مثبت، برخی از باکتری‌های گرم منفی مانند پاستورلا و گونه‌های مایکوپلازما است.

**موارد مصرف:** جهت کنترل و درمان بیماری‌های تنفسی ناشی از مایکوپلازما گالی سیتیکوم، مایکوپلازما سینوویه در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین.  
جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک ناشی از کلسترییدیوم پرفریجنس در طیور.

**مصادر منع مصرف:** درمرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود. در موارد حساسیت به تایلوژین و سایر ماکرولیدها استفاده نگردد. در حیوانات واکسینه شده با واکسن‌های حساس به تایلوژین در همان زمان یا یک هفته قبل از آن، استفاده نگردد. در حیوانات دارای نارسایی کبدی استفاده نگردد. برای اسب‌ها استفاده نگردد.

**میزان و نحوه مصرف:**

درجوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین تخم‌گذار:

**جهت کنترل و درمان بیماری‌های تنفسی:** ۱۲۷ میلی‌گرم تایلوژین به ازای هرکیلوگرم وزن بدن (معادل ۵۰۸ میلی‌گرم پرمیکس نیازوفید®) یا ۴/۴ کیلوگرم نیازوفید® در هرتن خوراک در ۵ روز اول زندگی و سپس درمان پرنده در سن ۴ - ۳ هفتگی تکرار شود (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

**جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک:** ۲۰ - ۱۰ میلی‌گرم تایلوژین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل ۸۰ - ۴۰ میلی‌گرم پرمیکس نیازوفید®) به مدت ۷ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

**توجه:** مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس

**نیازوفید®** را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید. برای به دست آوردن میزان دوز مصرفی صحیح تایلوژین بایستی بر اساس دوز توصیه شده، تعداد و وزن حیوانات تحت درمان، طبق فرمول زیر محاسبه گردد:

$$\text{میانگین وزن بدن (کیلوگرم)} \times \frac{\text{میلی‌گرم محصول برای هر گله تحت درمان}}{\text{کیلوگرم وزن بدن در هر روز}} = \frac{\text{میلی‌گرم محصول به ازای هر کیلوگرم غذای مخلوط شده}}{\text{میانگین مصرف روزانه غذای مخلوط شده (کیلوگرم) هر گونه}}$$

**تداخل دارویی:** از مخلوط کردن و مصرف همزمان نیازوفید® همراه با سایر آنتی‌بیوتیک‌ها خودداری گردد. از تجویز همزمان نیازوفید® با لینکوزامیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

**زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل ازکشتار**

**موارد احتیاط:** این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس نیازوفید® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

**شرایط نگهداری:** درمکان خشک وخنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

**مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید  
**بسته بندی:** فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)