



ویتامین AD3ECK3

سیداک®

ویتامین / محلول خوراکی

ترکیب: هر لیتر حاوی:

ویتامین A (پالمیتات) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین D₃ (کوله کلسیفرول کریستال) ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (دی ال-آلفا توکوفرول استات) ۱۰ گرم
ویتامین C (اسید اسکوربیک) ۱۰۰ گرم
ویتامین K₃ (منادیون سدیم بی سولفیت) ۱/۵ گرم
موادجانبی و حامل تا ۱ لیتر

گونه هدف: طیور، گوساله، گاو، گوسفند، بز

مکانیسم اثر:

ویتامین A: نقش مهمی در حفاظت از بافت اپیتلیال از جمله: شبکیه چشم، پوست و غشاهای مخاطی دارد و در نتیجه به عنوان یک محافظ در برابر عفونت‌های عمومی است.

ویتامین D₃: تنظیم و تصحیح متابولیسم کلسیم و فسفر را در خون انجام داده و نقش مهمی در جذب کلسیم و فسفر از روده بر عهده دارد. به ویژه در حیوانات جوان تر و در حال رشد برای توسعه طبیعی اسکلت و دندان‌ها ضروری است.

ویتامین E: این ویتامین نقش مهمی در رشد و باروری، افزایش مقاومت بدن و حفظ ثبات ویتامین A داشته و به طور کلی به عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی مطرح است.

ویتامین C: یک آنتی‌اکسیدان بوده که در چندین عمل فیزیولوژیکی از جمله واکنش‌های اکسیداسیون و احیاء سنتز هورمون‌های استروئیدی و بهبود سیستم ایمنی نقش دارد.

ویتامین K₃: به لخته شدن خون کمک نموده و در ارتباط با ویتامین A و D₃ در بدن به ساخته شدن پروتئین‌های استخوان کمک می‌کند.

موارد مصرف: سیداک® جهت پیشگیری و کمک به بهبود ضایعات ناشی از کمبود ویتامین‌های A، C، E، D₃ و K₃ در دام و طیور کاربرد دارد. بهبود میزان رشد و ضریب تبدیل غذایی. بهبود کیفیت پوسته تخم‌مرغ و افزایش تولید تخم‌مرغ و باروری و جوجه درآوری. کمک به تقویت سیستم ایمنی در شرایط استرس‌های مختلف از جمله: حمل و نقل، واکسیناسیون، استرس گرمایی، در بیماری‌های ویروسی و باکتریایی و به دنبال درمان کوکسیدیوز، کمک به جلوگیری از

خونریزی‌های ممتد ناشی زخم‌هایی مانند کانی‌بالیسیم. کمک به درمان ناهنجاری‌های اسکلتی.

میزان و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز.
گوسفند و بز: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.
گاو و گوساله: ۲ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول تهیه شده حاوی دارو تا ۱۲ ساعت بعد باید استفاده شود. پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۲۰ روز مصرف شود.
میزان مصرف محلول‌های خوراکی و یا پودرهای محلول در آب در فصول مختلف (آب و هوای گرم یا سرد) وابسته به میزان مصرف آب توسط حیوان هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری‌های پلی‌اتیلنی یک لیتری.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)