



دیکلازوریل ۰/۵٪

دیکلامیکس®

ضد کوکسیدیوز سنتتیک / پودر گرانول مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

دیکلازوریل ۵ گرم
مواد حامل و جانبی تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: دیکلازوریل یک ضدکوکسیدیوز سنتتیک از مشتقات خانواده بنزن استونیتریل است که روی مراحل جنسی و غیر جنسی زندگی انگل اثر گذاشته و از طریق ایجاد اختلال در ساخت دیواره اووسیت‌ها چرخه زندگی انگل را مختل کرده و تولید اووسیت‌ها را کاهش می‌دهد. دیکلازوریل بسته به گونه کوکسیدیا بر روی مراحل مختلف چرخه زندگی انگل موثر است.

موارد مصرف: دیکلامیکس® جهت کمک در کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز ناشی از آیمریا تنلا، آیمریا آسرولینا، آیمریا برونٹی، آیمریا نکاتریکس، آیمریا ماگزیمما و آیمریا میتیس (میواتی) در طیور گوشتی و پولت‌های جایگزین (تا ۱۶ هفتگی) و همچنین کنترل و پیشگیری کوکسیدیوز ناشی از آیمریا آدنوئیدس، آیمریا گالوپاوونیس و آیمریا مله‌اگریمیتیس در بوقلمون در حال رشد (تاسن ۱۲ هفتگی) به کار می‌رود.

موارد منع مصرف: درمرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:

۲۰۰ گرم دیکلامیکس® (معادل ۱ گرم یا ۱ ppm دیکلازوریل) در هر تن خوراک نهایی مخلوط می‌شود.

دیکلامیکس® را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی: از مصرف هم‌زمان با سایر ضدکوکسیدیوزها خودداری گردد.

زمان برهیز از مصرف: ۵ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس دیکلامیکس® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید

بسته بندی: فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۲/۵ کیلوگرمی.

گونه هدف	دیکلازوریل (بی.بی.ام)	دیکلامیکس® (گرم در تن خوراک)	حداکثر سن برای استفاده
جوجه‌های گوشتی	۱	۲۰۰	-
پولت‌های جایگزین	۱	۲۰۰	۱۶ هفتگی
بوقلمون‌های در حال رشد	۱	۲۰۰	۱۲ هفتگی

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)