



تایلوزین فسفات ۲۵٪

فیدوزین®

آنتی باکتریال / پودر مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

تایلوزین فعال (بصورت تایلوزین فسفات) ۲۵۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: تایلوزین یک آنتی‌بیوتیک ماکرولیدی و دارای خاصیت باکتری‌استاتیک است که از تخمیر نوعی قارچ به نام استرپتومایسس فرادیا بدست می‌آید. تایلوزین اثر ضد میکروبی خود را با مهار سنتز پروتئین‌ها در میکروارگانیسم‌های حساس انجام می‌دهد. طیف اثر آن شامل باکتری‌های گرم مثبت، برخی از باکتری‌های گرم منفی مانند پاستورلا و گونه‌های مایکوپلاسما است.

موارد مصرف: جهت کنترل و درمان بیماری‌های تنفسی ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیوکوم، مایکوپلاسما سینوویه در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین.
جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک ناشی از کلس‌تری‌دیوم پرفریجنس در طیور.

موارد منع مصرف: درمرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود. در موارد حساسیت به تایلوزین و سایر ماکرولیدها استفاده نگردد. در حیوانات واکسینه شده با واکسن‌های حساس به تایلوزین در همان زمان یا یک هفته قبل از آن، استفاده نگردد. در حیوانات دارای نارسایی کبدی استفاده نگردد. برای اسب‌ها استفاده نگردد.

میزان و نحوه مصرف:

درجوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین تخم‌گذار:

جهت کنترل و درمان بیماری‌های تنفسی: ۱۲۷ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هرکیلوگرم وزن بدن (معادل ۵۰۸ میلی‌گرم پرمیکس فیدوزین®) یا ۴/۴ کیلوگرم فیدوزین® در هرتن خوراک در ۵ روز اول زندگی و سپس درمان پرندۀ در سن ۴ - ۳ هفتگی تکرار شود (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۲۰ - ۱۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل ۸۰ - ۴۰ میلی‌گرم پرمیکس فیدوزین®) به مدت ۷ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس

فیدوزین® را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید. برای به دست آوردن میزان دوز مصرفی صحیح تایلوزین بایستی بر اساس دوز توصیه شده، تعداد و وزن حیوانات تحت درمان، طبق فرمول زیر محاسبه گردد:

$$\text{میانگین وزن بدن (کیلوگرم)} \times \text{میلی‌گرم محصول برای هر کله تحت درمان (کیلوگرم وزن بدن در هر روز)} = \text{میلی‌گرم محصول به ازای هر کیلوگرم غذای مخلوط شده}$$

میانگین مصرف روزانه غذای مخلوط شده (کیلوگرم) هر گونه

تداخل دارویی: از مخلوط کردن و مصرف همزمان فیدوزین® همراه با سایر آنتی‌بیوتیک‌ها خودداری گردد. از تجویز همزمان فیدوزین® با لینکوز‌آمیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل ازکشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس فیدوزین® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: درمکان خشک وخنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)