



اکسی تتراسایکلین ۵٪ فیدکس® آنتی باکتریال / پودر مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

اکسی تتراسایکلین بیس ۵۰۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: اکسی تتراسایکلین آنتی باکتریال وسیع الطیف باکتریواستاتیک است که متعلق به گروه تتراسایکلین ها بوده و در برابر طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، همچنین مایکوپلاسماها، ریکتزیاها، کلامیدیاها، برخی از پروتوزوآها و سایر عفونت های حساس به اکسی تتراسایکلین مؤثر است که از طریق ممانعت از اتصال آمینوآسیل ترانسفراز ریبونوکلئیک اسید (aa- tRNA) بر روی تحت واحد ۳۰S ریبوزوم از سنتز پروتئین باکتری های در حال رشد جلوگیری می کند.

موارد مصرف: فیدکس® جهت کنترل و درمان سینوویت عفونی، وبای طیور، عفونت کیسه های هوایی در طیور، هگزامیتیاژیس و بیماری تاج آبی در بوقلمون به کار میرود.

موارد منع مصرف:

در موارد حساسیت به گروه تتراسایکلین ها و نارسایی کبدی و کلیوی استفاده نگردد.
درمرغان تخم گذاری که تخم مرغ آن ها به مصرف انسان می رسد، استفاده نگردد.

میزان و نحوه مصرف:

طیور: (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

• کنترل سینوویت عفونی ناشی از مایکوپلاسما سینوویه و وبای طیور ناشی از پاستورلامولتی سیدا حساس به اکسی تتراسایکلین: ۴۰۰ - ۲۰۰ گرم فیدکس® در تن خوراک به مدت ۷-۱۴ روز بطور مداوم.

• کنترل بیماری مزمن تنفسی (CRD) و عفونت کیسه های هوایی ناشی از مایکوپلاسما گالیسپتیکوم و اشرشیاکولی (E.Coli) حساس به اکسی تتراسایکلین: ۸۰۰ گرم فیدکس® در تن خوراک به مدت ۱۴-۷ روز بطور مداوم.

• کاهش مرگ و میر ناشی از عفونت کیسه های هوایی ناشی از اشرشیاکولی (E.Coli) حساس به اکسی تتراسایکلین: ۱۰۰۰ گرم فیدکس® در تن خوراک به مدت ۵ روز بطور مداوم.

بوقلمون: (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

• کنترل سینوویت عفونی ناشی از مایکوپلاسما سینوویه حساس به اکسی تتراسایکلین: ۴۰۰ گرم فیدکس® در تن خوراک به مدت ۷-۱۴ روز بطور مداوم.

• کنترل هگزامیتیاژیس ناشی از هگزامیتامله آگریتیس حساس به اکسی تتراسایکلین: ۲۰۰ گرم فیدکس® در تن خوراک به مدت ۷-۱۴ روز بطور مداوم.

• کنترل عوامل باکتریایی پیچیده مرتبط با بیماری تاج آبی (التهاب روده ای ویروسی کرونا، التهاب روده ای مسری) حساس به اکسی تتراسایکلین: ۵۰ میلی گرم فیدکس® به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه در تن خوراک به مدت ۷-۱۴ روز بطور مداوم.

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه میشود ابتدا پرمیکس را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی: از مصرف فیدکس® همراه با کینولون ها، پنی سیلین، پلی میکسین ب، استرپتومایسین، باسیتراسین، نئومایسین، بیکرینات سدیم خودداری گردد. مصرف کاتیون ها مانند منیزیم، منگنز، آهن و آلومینیوم با گروه تتراسایکلین ها بدلیل تشکیل شلاته باعث کاهش اثر آن ها می شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۷ روز قبل ازکشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس فیدکس® با چشم ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید

بسته بندی: فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.