



موننتین سدیم ۱۰٪

موننتین®

ضد کوکسیدیوز / پودر گرانول مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

موننتین سدیم ..... ۱۰۰ گرم  
مواد حامل و جانبی تا..... ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور، بوقلمون، گوساله، بره، گاو شیری و گاو گوشتی

**مکانیسم اثر:** موننتین یک کوکسیدیواستات مونوآلان پلی اتر از گروه یونوفوره‌ها است که عمل ضدکوکسیدیوزی را برعلیه برخی از گونه‌های آیمیریا انجام داده و بر روی تروفوزوئیت‌ها در اولین مرحله تقسیم شیزوگونی تأثیر می‌گذارد.

موننتین قادر است با یون‌های تک ظرفیتی (سدیم و پتاسیم)، کمپلکس‌های یونی قابل حل در چربی تشکیل دهد. همچنین سبب افزایش ورود سدیم به داخل انگل و تحریک پمپ سدیم - پتاسیم شده و این اعمال باعث تجمع یون سدیم، افزایش فشار اسمزی و جذب آب و بالاخره تورم اسپروزوئیت و انهدام انگل می‌شود.

**موارد مصرف:** موننتین® به‌منظور کمک در کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های تخم‌گذار تا سن ۱۶ هفتگی، که به وسیله آیمیریا تنلا، آ.آسروولینا، آ.میوواتی، آ.برونتی، آ.ماکسیما و آنکاتریکس ایجاد می‌گردد، استفاده می‌شود. همچنین جهت کمک در کنترل و پیشگیری از کوکسیدیوز در بوقلمون تا سن ۱۶ هفتگی که به‌وسیله آیمیریا آدنوتیدوس، آیمیریا مله آگریمیتیس و آیمیریا گالوپاوونیس ایجاد می‌شود و در نشخوارکنندگان برای افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذا با پیش معده توسعه یافته (گوساله و بره از شیر گرفته) و برای پیشگیری از کتوز در گاوهای شیری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**اخطار:** محدوده درمانی به دوز کشنده

[LD50chicks = 284±47 mg/kg, orally]

موننتین بسیار نزدیک است، بنابراین می‌بایست دوز دقیق و در سطوح توصیه‌شده مصرف گردد.

**موارد منع مصرف:** خوراک حاوی موننتین، در طیور تخم‌گذار، بوقلمون (بیشتر از ۱۶ هفته)، پرندگان آبی، مرغ‌های شاخ‌دار و سایر گونه‌های پرندگان نباید مصرف گردد. در اسب و سایررتک سومی‌ها منع مصرف دارد.

**میزان و نحوه مصرف:**

نحوه مصرف به‌صورت خوراکی و از طریق مخلوط کردن با خوراک است.

گونه هدف	موننتین سدیم به‌صورت خالص (بی‌آب/آب)	پرمیکس موننتین® (گرم در تن خوراک)	زمان مصرف
جوجه گوشتی	۱۰ - ۱۲۰	۱۰۰۰ - ۱۲۰۰	کل دوره پرورش تا ۳ روز قبل از کشتار
پولت‌های جایگزین تخمگذار	۱۰ - ۱۲۰	۱۰۰۰ - ۱۲۰۰	تا سن ۱۶ هفتگی
بوقلمون	۶۰ - ۱۰۰	۶۰۰ - ۱۰۰۰	تا سن ۱۶ هفتگی
بره و گوساله‌های پروری	۱۰	۱۰۰	کل دوره پرورش
بره و گوساله‌های پروری با کنسانتره و علوفه	۱۰ - ۲۰	۱۰۰ - ۲۰۰	به ترتیب در طی اولین (۴۰ الی ۵۰ روزگی و دومین دوره پرورش)
گاو شیری	۲/۵ گرم موننتین® به ازای هر راس روزانه و در دو وعده مساوی		

**توجه:** مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس را بر اساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

**تداخل دارویی:** موننتین با داروهای تیامولین، اریتروماکسین، اولواندوماکسین، سولفادیمیدین، سولفادیمتوکسین و سولفاکینوکسالیل تداخل دارویی داشته و منع مصرف دارد.

**اثرات جانبی:** در صورت مسمومیت حاد (مصرف بیش از دوز توصیه شده) ممکن است کاهش رشد و مسمومیت (به صورت از دست دادن اشتها، لرزش، فلجی اندام و مرگ) رخ دهد.

**زمان پرهیز از مصرف:** ۳ روز قبل ازکشتار

**موارد احتیاط:** این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید. در صورت تماس موننتین® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

**شرایط نگهداری:** در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

**مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید

**بسته بندی:** فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

دروسازان ایران

(سهامی خاص)