



مولتی ویتامین + اسید آمینه

پلی آمین®

ویتامین / محلول خوراکی

ترکیب: هر لیتر حاوی:

ویتامین A (پالمیتات) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین D3 (کوله کلسیفرول کریستال) ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
ویتامین E (دی-آلفا توکوفرول استات) ۴۰ گرم
ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) ۱/۵ گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین-5 فسفات سدیم) ۲/۵ گرم
دکسپانتنول ۵ گرم
نیکوتین آمید ۱۰ گرم
ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) ۲ گرم
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) ۵ میلی‌گرم
گلایسین ۲۰ گرم
آل - لیزین هیدروکلراید ۳۰ گرم
آل - متیونین ۲۵ گرم
سوربیتول ۵۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ۱ لیتر

گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:

مولتی ویتامین + اسید آمینه ترکیبی متعادل از اسیدهای آمینه ضروری و ویتامین‌ها است که در دام و طیور کاربرد دارد.

موارد مصرف: پلی آمین® به منظور پیشگیری و درمان کمبودهای اسید آمینه و ویتامین‌ها و همچنین به دنبال درمان‌های انگلی، کوکسیدیوز، عفونت باکتریایی یا ویروسی به کار برده می‌شود. پلی آمین® باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن شده و موجب تقویت سیستم ایمنی در شرایط استرس‌های مختلف ازجمله: حمل و نقل، واکسیناسیون، استرس گرما و... می‌شود.

میزان و نحوه مصرف:

۱ تا ۲ لیتر محلول پلی آمین® در هر ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز یا طبق نظر دکتر دامپزشک.

توجه:

مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول تهیه شده بایستی در عرض ۱۸ ساعت مصرف شود. پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۲۰ روز مصرف گردد. میزان مصرف محلول‌های خوراکی و یا پودرهای محلول در آب در فصول مختلف (آب و هوای گرم یا سرد) وابسته به میزان مصرف آب توسط حیوان هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری‌های پلی‌اتیلنی یک لیتری.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)