



مولتی ویتامین + الکترولیت

پلی لیت®

ویتامین / محلول خوراکی

ترکیب: هر لیتر حاوی:

ویتامین A (پالمیتات) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
 ویتامین D3 (کوله کلسیفرول کریستال) ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
 ویتامین E (دی‌ال-آلفا توکوفرول استات) ۵ گرم
 ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) ۲ گرم
 ویتامین B2 (ریبوفلاوین-5 فسفات سدیم) ۲ گرم
 دکسپانتنول ۵ گرم
 نیکوتین آمید ۱۰ گرم
 ویتامین B6 (پیریدوکسین هیدروکلراید) ۱ گرم
 سدیم کلراید ۱۰ گرم
 پتاسیم کلراید ۱ گرم
 پتاسیم استات ۲ گرم
 منیزیم کلراید ۳ گرم
 سوربیتول ۵۰ گرم
 موادجانبی وحامل تا ۱ لیتر

گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:

ویتامین‌ها ترکیباتی هستند که در تمام اعمال حیاتی بدن از جمله حفظ و نگهداری بافت‌ها، مقاومت در مقابل اجرام بیماری‌زا و استرس‌ها، بالا بردن ایمنی بدن و عملکرد صحیح اعضاء بدن نقش حیاتی و منحصر بفرد دارند و از آنجا که بدن حیوانات قادر به ساخت این ترکیبات نیست حتما باید به صورت خوراکی در جیره غذایی آنها منظور شود. همچنین الکترولیت‌ها موادی هستند که تعادل آن‌ها در بدن اهمیت بسیاری دارد و کمبود آنها می‌تواند منجر به بروز عوارض مختلف شود.

موارد مصرف: پلی لیت® با حفظ بهینه مایعات در تعادل الکترولیتی، بهبود هضم و مصرف غذا کمک کرده و الکترولیت‌های حیاتی را در صورت هر نوع از دست دادن آب بدن ناشی از اسهال، در حین و یا پس از درمان‌های انگلی، آنتی‌بیوتیک و کوکسیدیوز تامین می‌کند. پلی لیت® جهت کمک به بهبود ضایعات ناشی از کمبود ویتامین‌ها در دام و طیور به کار می‌رود، همچنین موجب تقویت سیستم ایمنی در شرایط استرس‌های مختلف از جمله: واکسیناسیون، حمل و نقل، تغییرات رژیم غذایی، نوک چینی، شیردهی و ... می‌شود.

میزان و نحوه مصرف:

طیور: یک لیتر در هر ۱۰۰۰ - ۸۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز.
 بره و بزغاله: ۵/۵ تا یک میلی‌لیتر به ازای هر راس به مدت ۳ روز.
 گوساله: ۱ تا ۲ میلی‌لیتر به ازای هر راس به مدت ۳ روز.
 اسب: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز.

توجه:

مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول تهیه شده بایستی در عرض ۱۸ ساعت مصرف شود. پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۲۰ روز مصرف گردد. میزان مصرف محلول‌های خوراکی و یا پودرهای محلول در آب در فصول مختلف (آب و هوای گرم یا سرد) وابسته به میزان مصرف آب توسط حیوان هدف است. تیره‌شدن تدریجی محصول تاثیری در پایداری آن ندارد. در صورت نگهداری در دمای نامناسب، امکان رسوب محصول وجود دارد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: درمکان خشک و خنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری‌های پلی‌اتیلنی یک لیتری.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)