



مولتی ویتامین

پلی تامین®

ویتامین / محلول خوراکی

ترکیب: هر لیتر حاوی:

ویتامین A (پالمیتات) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
 ویتامین D₃ (کوله کلسیفرول کریستال) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد بین‌المللی
 ویتامین E (دی-آل-آلفا توکوفرول استات) ۱۰ گرم
 ویتامین B₁ (تیامین هیدروکلراید) ۲ گرم
 ویتامین B₂ (ریبوفلاوین-۵ فسفات سدیم) ۲/۶۷ گرم
 دکسپانتنول ۵ گرم
 نیکوتین آمید ۱۰ گرم
 ویتامین B₆ (پیریدوکسین هیدروکلراید) ۱/۵ گرم
 مواد حامل و جانبی تا ۱ لیتر

گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:

ویتامین A: نقش مهمی در حفاظت از بافت اپیتلیال از جمله: شبکیه چشم، پوست و غشاهای مخاطی دارد و در نتیجه به عنوان یک محافظ در برابر عفونت‌های عمومی است.

ویتامین D₃: تنظیم و تصحیح متابولیسم کلسیم و فسفات را در خون انجام داده و نقش مهمی در جذب کلسیم و فسفات از روده بر عهده دارد و در حیوانات جوان‌تر و در حال رشد برای توسعه طبیعی اسکلت و دندان‌ها ضروری است.

ویتامین E: این ویتامین نقش مهمی در رشد و باروری، افزایش مقاومت بدن و حفظ ثبات ویتامین A داشته و به طور کلی به عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی مطرح است.

کمبود ویتامین‌های **گروه B** باعث ایجاد عوارض پوستی و عصبی می‌شود.

موارد مصرف: پلی تامین® جهت کمک به بهبود ضایعات ناشی از کمبود ویتامین‌ها در دام و طیور به کار می‌رود، همچنین به بهبود جذب مواد مغذی، افزایش وزن گله و کاهش ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی، افزایش تولید تخم‌مرغ و جوجه درآوری در مرغ‌های تخم‌گذار و افزایش باروری، بقاء و مقاومت گله‌های مادر کمک می‌کند.

پلی تامین® موجب تقویت سیستم ایمنی در شرایط استرس‌های مختلف از جمله: واکنش‌های ایمنی، حمل و نقل، تغییرات رژیم غذایی، نوک چینی، شیردهی و ... می‌شود.

میزان و نحوه مصرف:

طیور: ۱ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۷-۵ روز.

دام‌های جوان:

بره: ۲/۵ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.

گوساله و کره اسب: ۱۰ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.

دام‌های آبستن:

میش: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.
گاو و مادیان: ۱۰ میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.

توجه:

مدت و مقدار مصرف با نظر دامپزشک تعیین گردد. محلول تهیه شده بایستی در عرض ۱۸ ساعت مصرف شود. پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۲۰ روز مصرف گردد.

میزان مصرف محلول‌های خوراکی و یا پودرهای محلول در آب در فصول مختلف (آب و هوای گرم یا سرد) وابسته به میزان مصرف آب توسط حیوان هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری‌های پلی‌اتیلنی یک لیتری.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)