



سالینومایسین سدیم ۱۲٪ ساکوکس® ۱۲۰

ضد کوکسیدیوز / پودر میکرو گرانول مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

سالینومایسین سدیم ۱۲۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: سالینومایسین یک کوکسیدیواستات مونوآلان پلی اتر از گروه یونفوردها است. فعالیت بیولوژیکی سالینومایسین ناشی از ویژگی آن در تشکیل کمپلکس‌های یونی است، به ویژه توانایی آن برای انتقال یون‌های پتاسیم به داخل و خارج از سلول. اختلال ناشی از غلظت یون‌های بین سلولی انگل، فعالیت کوکسیدیواستات‌ها را توضیح می‌دهد. سالینومایسین اثرات کوکسیدیواستاتی بر اسپوروزوئیت‌ها و مروزوئیت‌ها دارد. در مرحله بعدی شیزونت‌ها نیز به شدت از بین رفته و منجر به حداقل آسیب در روده می‌شود.

موارد مصرف: ساکوکس® ۱۲۰ به منظور پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز در جوجه‌های گوشتی و بولت‌های جایگزین تخم‌گذار (تا سن ۱۲ هفتگی) مصرف می‌شود و بر گونه‌های مختلف آیمریا شامل: آ. آسرولینا، آ. ماکزیمیا، آ. نکاتریکس، آ. میواتی، آ. تنلا، آ. برونٹی موثر است.

موارد منع مصرف:

در اسب، سایر تک‌سمی‌ها و بوقلمون منع مصرف دارد.

میزان و نحوه مصرف:

جوجه‌های گوشتی: ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک
بولت‌های جایگزین تخم‌گذار: ۴۰۰ گرم در هر تن خوراک

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی: بهتر است طیور تحت درمان تا ۷ روز قبل و بعد از مصرف ساکوکس® ۱۲۰ از تیمولین استفاده نکنند.

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل از کشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس ساکوکس® ۱۲۰ با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

هشدار محیط زیست: بعد از عبور ساکوکس® ۱۲۰ از دستگاه گوارش مقدار کمی از آن به عنوان ماده فعال دفع می‌شود. نیمه عمر آن در خاک ۴۰-۵۰ ساعت است. ساکوکس® ۱۲۰ توسط گیاهان جذب نمی‌شود و نامحلول در آب است.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.



تحت لیسانس شرکت هووفارما®