



## ساکارومیسس سروایسیا

# تپاکس®

### پریبیوتیک (محرک طبیعی رشد) / پودر مخلوط در دان

**ترکیب:** هر کیلوگرم حاوی:

ساکارومیسس سروایسیا ..... ۳۳۳/۳ گرم  
مواد حامل و جانبی تا ..... ۱۰۰۰ گرم

**گونه هدف:** دام، طیور، آبزیان

**مکانیسم اثر:** این مکمل غذایی شامل پریبیوتیک خالص و غیر فعال شده (کشته شده) از سلول‌های مخمر گونه الیپسوتیدوس و از گروه ساکارومیسس سروایسیا بوده که با ایجاد pH مناسب در دستگاه گوارش (ایجاد شرایط اسیدی) از رشد عوامل بیماری‌زا جلوگیری کرده و از طریق رساندن اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها و سایر مواد ضروری سبب تحریک رشد میکروارگانیسم‌های مفید دستگاه گوارش به خصوص لاکتوباسیل‌ها شده و با سنتز دیواره سلولی، افزایش کاتابولیس‌م درون سلولی، تکثیر و افزایش قدرت ایمنی، به حیوان میزبان سود می‌رسانند و همچنین باعث افزایش راندمان فرایند هضم و جذب در دستگاه گوارش می‌شود.

#### موارد مصرف:

- بهبود هضم مواد غذایی از طریق افزایش تولید آنزیم‌های باکتریایی روده.
- افزایش جذب مواد غذایی از طریق افزایش رشد میکروویلی‌های روده و کاهش تولید سموم تولید شده باکتریایی در روده.
- افزایش تولید و بهبود ضریب تبدیل غذایی (FCR).
- کاهش هزینه‌های تولید.
- بهبود کیفیت تولید (گوشت، شیر، تخم‌مرغ و غیره).
- کاهش رشد عوامل بیماری‌زا.
- افزایش سرعت جبران فلور میکروبی دستگاه گوارش در مقابل استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها.
- بهبود سطح سلامتی و مقاومت به بیماری‌ها از طریق تحریک سیستم ایمنی بوسیله فلور مفید روده.
- کاهش میزان تخمیر غیرطبیعی به علت کاهش تولید سموم روده.
- بهبود مقاومت در برابر استرس.

**موارد منع مصرف:** این ماده هیچ منع مصرفی در دام، طیور و آبزیان حتی تا زمان کشتار ندارد.

#### میزان و نحوه مصرف:

میزان مصرف این ماده در یک تن از جیره‌های گونه‌های مختلف به شرح زیر است:

گونه هدف	زمان مصرف	مقدار مصرف
جوجه گوشتی	پیش‌دان	۱۰۰۰ گرم در یک تن دان مصرفی
	میان‌دان پس‌دان	۵۰۰ گرم در یک تن دان مصرفی ۳۰۰ - ۲۵۰ گرم در یک تن دان مصرفی
مرغ تخم‌گذار	در طول دوره پرورش	۷۰۰ - ۵۰۰ گرم در یک تن دان مصرفی
	گوساله گاو گوشتی	در طول دوره پرورش تا وزن ۳۰۰ کیلوگرم بالای وزن ۳۰۰ کیلوگرم
گاو شیری	در طول دوره پرورش	۱۰۰۰ گرم در یک تن دان مصرفی ۵۰۰ گرم در یک تن دان مصرفی
	ماهی میگو	حداقل برای سه ماه متوالی اول حداقل برای سه ماه متوالی اول
بوقلمون	در طول دوره پرورش	یک الی ۱/۵ تا کیلوگرم در یک تن ماده غذایی

**توجه:** مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد.

**زمان پرهیز از مصرف:** ندارد.

**موارد احتیاط:** این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**شرایط نگهداری:** در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

**مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید  
**بسته بندی:** پاکت کاغذی چند لایه ۱۰ کیلوگرمی.

ماده اولیه از شرکت داکسال® ایتالیا



آزمایشگاه‌های تولیدی

## داروسازان ایران

(سهامی خاص)