



تایلوزین فسفات ۲۵٪

تایلووت®

آنتی باکتریال / پودر مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

تایلوزین فعال (بصورت تایلوزین فسفات) ۲۵۰ گرم
مواد حامل و جانبی تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: تایلوزین یک آنتی‌بیوتیک ماکرولیدی با خاصیت باکتری‌استاتیک بوده که از تخمیر نوعی قارچ به نام استرپتومایسس فرادیا بدست می‌آید. تایلوزین اثر ضد میکروبی خود را با مهار سنتز پروتئین‌ها در میکروارگانیزم‌های حساس انجام می‌دهد. طیف اثر آن شامل باکتری‌های گرم مثبت، برخی از باکتری‌های گرم منفی مانند پاستورلا و گونه‌های میکوپلازما است.

موارد مصرف: جهت کنترل و درمان بیماری‌های تنفسی ناشی از مایکوپلازما گالی سپتیکوم، مایکوپلازما سینوویه در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین. جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک ناشی از ازلستریدیوم پرفریجنس در طیور.

موارد منع مصرف: در مرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود. در موارد حساسیت به تایلوزین و سایر ماکرولیدها استفاده نشود. در حیوانات واکسینه شده با واکسن‌های حساس به تایلوزین در همان زمان یا یک هفته قبل از آن استفاده نشود. در حیوانات دارای نارسایی کبدی استفاده نشود. برای اسب‌ها استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:

درجوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین تخم‌گذار:

جهت کنترل و درمان بیماری‌های تنفسی: ۱۲۷ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هرکیلوگرم وزن بدن (معادل ۵۰۸ میلی‌گرم پرمیکس تایلووت®) یا ۴/۴ کیلوگرم تایلووت® در هرتن خوراک در ۵ روز اول زندگی و سپس درمان پرنده در سن ۳-۴ هفتهگی تکرار شود (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۲۰ - ۱۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل ۸۰ - ۴۰ میلی‌گرم پرمیکس تایلووت®) به مدت ۷ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس تایلووت® را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید. برای بدست آوردن میزان صحیح دوز مصرفی تایلوزین بایستی بر اساس دوز توصیه شده، تعداد و وزن حیوانات تحت درمان، طبق فرمول زیر محاسبه گردد:

$$\text{میانگین وزن بدن (کیلوگرم)} \times \text{میلی‌گرم محصول برای هر گله تحت درمان کیلوگرم وزن بدن در هر روز} = \frac{\text{میلی‌گرم محصول به ازای هرکیلوگرم غذای مخلوط شده}}{\text{میانگین مصرف روزانه غذای مخلوط شده (کیلوگرم) هر گونه}}$$

تداخل دارویی: از مخلوط کردن و مصرف همزمان تایلووت® همراه با سایر آنتی‌بیوتیک‌ها خودداری گردد. از تجویز همزمان تایلووت® با لینکوزامیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ۵ روز قبل ازکشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید. در صورت تماس تایلووت® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: درمکان خشک وخنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید

بسته بندی: فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.



ماده اولیه از شرکت هووفارما® بلژیک

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)