



آمپرولیوم ۲۵٪ + اتوپابات ۱/۶۸٪

آمپروفید®

ضد کوکسیدیوز سنتتیک / پودر مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

آمپرولیوم هیدروکلراید ۲۵۰ گرم

اتوپابات ۱۶/۸ گرم

مواد حامل و جانبی تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر:

آمپرولیوم از لحاظ شکل ساختمانی مشابه تیامین (ویتامین B1) بوده و به صورت آنتاگونیست رقابتی مانع از انتقال فعال تیامین در سیکل حیاتی آیمرباها شده و در نتیجه تیامین در دسترس کوکسیدیها قرار نمی‌گیرد. آمپرولیوم با اثر بر روی نسل اول شیزونت‌ها در سلول‌های جدار روده و جلوگیری از تمایز مروزوئیت‌ها اوج فعالیت خود را در سه روز اول چرخه زندگی آیمربا نشان می‌دهد. این دارو همچنین ممکن است باعث متوقف کردن مراحل جنسی و هاگ گذاری اووسیت‌ها گردد.

اتوپابات با ساختمانی مشابه پارا آمینوبنزوئیک اسید از جانشین شونده‌های آن بوده و با مهارستز تتراهیدروفولیک اسید تاثیر می‌گذارد. آنتاگونیست رقابتی مانع از انتقال فعال تیامین در سیکل حیاتی آیمرباها شده و در نتیجه تیامین در دسترس کوکسیدیها قرار نمی‌گیرد. آمپرولیوم با اثر بر روی نسل اول شیزونت‌ها در سلول‌های جدار روده و جلوگیری از تمایز مروزوئیت‌ها اوج فعالیت خود را در سه روز اول چرخه زندگی آیمربا نشان می‌دهد. این دارو همچنین ممکن است باعث متوقف کردن مراحل جنسی و هاگ گذاری اووسیت‌ها گردد.

آمپروفید® بر علیه گونه‌های آیمربا در طیور از قبیل: آیمربا تئلا، آیمربا نکاتریکس، آیمربا آسرولیتا، آیمربا برونٹی، آیمربا ماگزیما و آیمربا میتیس و نیز بر گونه‌های آیمربا آدنوئیدس، آیمربا مله آگریتیس و آیمربا گالوپاوونیس در بوقلمون موثر است.

موارد مصرف:

آمپروفید® جهت پیشگیری، کنترل بیماری کوکسیدیوز طیور (گوشتی، تخم‌گذار، مادر) و بوقلمون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد منع مصرف: در مرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی: ۵۰۰ گرم در هر تن دان. این میزان به طور مداوم تا ۳ روز قبل از کشتار به جیره غذایی اضافه گردد.
بوقلمون: ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک. این میزان باید به طور مداوم تا سن ۸-۱۰ هفتگی به جیره غذایی اضافه شود.
پولت‌های تخم‌گذار و مادر: میزان توصیه شده بر اساس سن پرنده به قرار زیر است:

- تا سن ۶ هفتگی ۴۰۰ گرم در هر تن دان (در مناطقی که احتمال بروز کوکسیدیوز وجود دارد میزان دارو در این مرحله سنی تا ۵۰۰ گرم در هر تن دان می‌تواند افزایش یابد).
- از سن ۶-۱۲ هفتگی ۳۲۵ گرم در هر تن دان.
- از سن ۱۲-۱۸ هفتگی ۲۵۰ گرم در هر تن دان.

در نیمچه‌های مادری که مصرف غذا در آن‌ها محدود شده باشد، میزان دارو تا ۵۰۰ گرم در هر تن می‌تواند افزایش یابد.

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس **آمپروپلاس®** را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی: **آمپروفید®** با ویتامین‌ها (به استثناء ویتامین B1)، مواد معدنی، آنتی بیوتیک‌ها و سایر محتویات جیره غذایی که در صنعت طیور استفاده می‌شود ناسازگاری ندارد ولی درجیره‌ای که حاوی مقادیر بالای کولین کلراید باشد، به دلیل تشکیل اسیدپیکریک نباید مصرف شود.

عوارض جانبی: درمان طولانی مدت با مقادیر بیش از حد توصیه شده **آمپروفید®** ممکن است منجر به تاخیر رشد و یا پلی‌نوریت درجوجه‌های گوشتی شده و همچنین می‌تواند کمبود ویتامین B1 را در میزبان ایجاد کند. توصیه می‌گردد که در صورت کمبود ویتامین B1، این ویتامین به صورت خوراکی تجویز شود. به دلیل شباهت ساختمانی آمپرولیوم با تیامین، بالا بودن میزان تیامین جیره غذایی می‌تواند باعث کاهش اثر دارو شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل ازکشتار

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گرد و غبار استفاده نمایید. در صورت تماس **آمپروفید®** با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید

بسته بندی: فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)