



ویتامین‌های گروه B + ویتامین K

ب.کا.سول®

ویتامین / پودر محلول در آب

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید)	۲۰۰۰ میلی‌گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین ۸۰ - اس دی)	۴۰۰۰ میلی‌گرم
کلسیم پنتوتنات	۱۰۰۰۰ میلی‌گرم
نیکوتین آمید	۲۰۰۰۰ میلی‌گرم
ویتامین B6	۲۰۰۰ میلی‌گرم
ویتامین B9	۲۵۰ میلی‌گرم
ویتامین B12	۲۰ میلی‌گرم
ویتامین H2	۵۰ میلی‌گرم
ویتامین K3	۲۰۰۰ میلی‌گرم
مواد حامل و جانبی تا	۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور

مکانیسم اثر: این دارو متعلق به گروه ویتامین‌ها بوده و عوارض ناشی از کمبود ویتامین‌های گروه B، K و H2 را کاهش می‌دهد. کمبود ویتامین B1 باعث ایجاد ستاره‌نگری، بروز ضایعات عصبی، ضعف پاها و بی‌اشتهایی می‌شود. همچنین در مرغ‌های مادر باعث کاهش جوجه‌آوری و درخروس‌ها موجب تحلیل رفتن بیضه‌ها می‌شود. کمبود ویتامین B2 باعث بروز اسهال و فلجی پنجه پا (Curled Toe Paralysis) می‌شود. کمبود ویتامین‌های B3، B5، B6، B9، B12 و H2 می‌تواند باعث کاهش رشد، افزایش ضریب تبدیل غذایی، عوارض پوستی و عصبی و حتی افزایش تلفات شود. کمبود ویتامین K باعث ایجاد بیماری کم‌خونی یا هموراژی می‌شود.

موارد مصرف:

برای افزایش راندمان تولید و رشد. درمان عوارض ناشی از کمبود ویتامین‌های گروه B، K، H2. در درمان خراشیدگی سنگدان و بوجود آمدن لکه‌های خونی در زرده تخم‌مرغ و درمان عارضه کاهش میزان جوجه‌آوری در مرغ‌هایی که تخم‌مرغ آن‌ها برای جوجه‌کشی استفاده می‌شود. در هنگام بروز بیماری‌هایی همچون کم‌خونی عفونی جوجه (CAV)، آنتریت‌های هموراژیک، کوکسیدیوز، بیماری‌های انگلی، گامبورو، تورم عفونی کبد و مسمومیت‌ها. پیشگیری از استرس ناشی از واکسیناسیون، نوک چینی، حمل و نقل و تغییر جیره غذایی. در زمان جوجه‌ریزی و ورود جوجه‌ها به سالن‌ها. در صورت مصرف طولانی مدت سولفونامیدها و سایر آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده از این ویتامین‌ها ضروری است. در صورت عدم استفاده از مواد اولیه حیوانی مانند پودر ماهی وجود ویتامین B12 در جیره غذایی ضروری است.

میزان و نحوه مصرف:

۱۵۰ - ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی.

توجه:

مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد. محلول تهیه شده بایستی در عرض ۱۸ ساعت مصرف گردد. میزان مصرف محلول‌های خوراکی و یا پودرهای محلول در آب در فصول مختلف (آب وهوای گرم یا سرد) وابسته به میزان مصرف آب توسط حیوان هدف است.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید
بسته بندی: ساشه آلومینیومی ۵۰۰ گرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)