



کلر تتراسایکلین ۲۰٪

# کلودیسول®

آنتی باکتریال / پودر محلول در آب

**ترکیب:** هر کیلوگرم حاوی:

کلر تتراسایکلین هیدروکلراید ..... ۲۰۰ گرم  
مواد حامل و جانبی تا ..... ۱۰۰۰ گرم

**گونه هدف:** طیور، بوقلمون، گوساله و بره

**مکانیسم اثر:** این دارو متعلق به گروه تتراسایکلین‌ها و یک آنتی باکتریال باکتریواستاتیک می‌باشد که بر روی تعداد زیادی باکتری های هوازی و بی‌هوازی گرم مثبت و گرم منفی و همچنین، کلامیدیاها، مایکوپلاسماها، ریکتزیا و برخی پروتوزوآها موثر می باشد. کلر تتراسایکلین سنتز پروتئین در باکتری را به وسیله باند شدن باریوزوم‌های باکتریایی مهار می‌کند.

**موارد مصرف:** این دارو جهت کنترل و درمان عفونت‌های تنفسی و سیستمیک ناشی از ارگانیزم‌های حساس به تتراسایکلین در طیور، بوقلمون، گوساله و بره به کار می‌رود.

**موارد منع مصرف:**

در موارد حساسیت به کلر تتراسایکلین و نارسایی کبدی و کلیوی استفاده نشود. در مرغان تخم‌گذاری که تخم‌مرغ آن‌ها به مصرف انسان می‌رسد، استفاده نشود. در نشخوارکنندگان بالغ نباید مورد استفاده قرار گیرد.

**میزان و نحوه مصرف:**

بر اساس ماده موثره:

**طیور:** ۲۰-۳۰ میلی‌گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور روزانه.  
**بوقلمون:** ۱۰-۳۰ میلی‌گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور روزانه.  
**گوساله و بره:** ۱۰-۲۰ میلی‌گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور روزانه.  
طول دوره درمان ۵-۷ روز است (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

از طریق آب آشامیدنی:

**طیور:** ۸۰-۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی.

**بوقلمون:** ۶۰-۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی.

طول دوره درمان ۵-۷ روز است (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

از طریق خوراک:

**طیور:** ۲۰۰۰-۱۵۰۰ گرم برای هر تن خوراک.  
**بوقلمون:** ۲۰۰۰-۱۰۰۰ گرم برای هر تن خوراک.

طول دوره درمان ۳-۴ روز است (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

**توجه:**

مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. محلول درمانی بایستی به صورت تازه روزانه تهیه و در عرض ۲۴ ساعت مصرف شود. در طول دوره درمان باید تنها منبع آب آشامیدنی، آب حاوی دارو باشد. در مناطقی که آب‌های سخت و با املاح زیاد مصرف می‌شود باید هر ۱۲ ساعت محلول تازه تهیه شود.

میزان دوز مصرفی محلول‌های خوراکی یا پودرهای محلول در آب بسته به میزان آب مصرفی می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای محیط (در فصول مختلف گرم و سرد)، محتوای نمک در غذا، وضعیت سلامت گله، تراکم، کیفیت و سختی آب مصرفی قرار گیرد.

**تداخل دارویی:** از مصرف همراه با آنتی‌بیوتیک‌های باکتریوسیدال مثل:

پنی‌سیلین‌ها و سفالوسپورین‌ها و ... خودداری شود.

مصرف کاتیون‌ها مانند: منیزیم، منگنز، آهن و آلومینیوم با گروه تتراسایکلین‌ها به دلیل تشکیل شلاته، باعث کاهش اثر آنها می‌شود.

**زمان پرهیز از مصرف:** در طیور و بوقلمون حداقل ۷ روز و در بره و گوساله ۱۴ روز قبل از کشتار.

**موارد احتیاط:** این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام تهیه محلول، حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس **کلودیسول®** با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

**شرایط نگهداری:** در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

**مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید

**بسته بندی:** ساشه آلومینیومی ۵۰۰ گرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)