



کلوپیدول ۲۵٪

کلوپیدال®

ضد کوکسیدوز سنتتیک / پودر مخلوط در دان

**ترکیب:** هر کیلوگرم حاوی:

کلوپیدول ..... ۲۵۰ گرم  
مواد حامل و جانی تا ..... ۱۰۰۰ گرم

**گونه هدف:** طیور

**مکانیسم اثر:** کلوپیدول یک کوکسیدوآستات وسیع‌الطیف سنتتیک است که مانع از متابولیسم انرژی در سیستم سیتوکروم اکسیداز کوکسیدایها شده و با اثر بر روی اسپروژوئیت‌های داخل سلولی در حیوان میزبان، از توسعه و رشد نسل اول شیزونت‌ها جلوگیری می‌کند. کلوپیدول در پیشگیری از کوکسیدوز ناشی از گونه‌های مختلف آیمریا از جمله آیمریا تنلا، آیمریا نکاتریکس، آیمریا برونٹی، آیمریا ماگزینا، آیمریا آسرولینا، آیمریا میتیس و آیمریا پراکوکس مؤثر است.

**موارد مصرف:** کلوپیدال® به منظور کمک به پیشگیری از کوکسیدوز در جوجه‌های گوشتی و پولت‌های تخم‌گذار تا سن ۱۶ هفتهگی به کار می‌رود.

**موارد منع مصرف:** کلوپیدال® نباید در مرغان تخم‌گذار بالای ۱۶ هفته مصرف گردد.

**میزان و نحوه مصرف:**

در جوجه‌های گوشتی برای تمام دوره پرورش و پولت‌های تخم‌گذار (تا سن ۱۶ هفتهگی): ۵۰۰ گرم کلوپیدال® در هر تن دان مصرفی (معادل ۱۲۵ پی‌پی‌ام کلوپیدول).

**توجه:** مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس کلوپیدال® را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

**تداخل دارویی:** کلوپیدال® نباید با هر نوع ماده دیگری که دارای اثرات مشابه است مخلوط شود.

**زمان پرهیز از مصرف:** ۵ روز قبل از کشتار

**موارد احتیاط:** این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مخلوط نمودن دارو با خوراک حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک

ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید. در صورت تماس کلوپیدال® با چشم‌ها، با آب فراوان شستشو داده شود.

**شرایط نگهداری:** در مکان خشک و خنک، دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

**مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید

**بسته بندی:** فویل آلومینیومی سه لایه لامینت شده ۵ کیلوگرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)