



لوامیزول ۷/۵%

لوامیزول ۷/۵%

ضدانگل / محلول خوراکی



ترکیب: هر لیتر حاوی:

لوامیزول هیدروکلراید ۷۵ گرم
موادجانبی وحامل تا ۱ لیتر

گونه هدف: دام و طیور

مکانیسم اثر:

لوامیزول بعنوان آگونیست گیرنده‌های استیل کولینی در عضلات نماتودها عمل کرده و باعث فلجی تشنجی آنها می‌شود. در نتیجه ماندگاری در دستگاه گوارش و تنفسی، از دست رفته و به سرعت از بدن حیوان خارج می‌گردند.

لوامیزول یک ضدانگل وسیع‌الطیف برای درمان آلودگی‌های انگلی دستگاه گوارش و تنفسی در گاو و گوسفند و طیور می‌باشد که بر علیه اکثر کرم‌های دستگاه گوارش و تنفسی حساس به دارو در مراحل نوزادی و بالغ بسیار موثر است.

گاو و گوسفند:

- انگل‌های گوارشی: گونه‌های همونکوس، استرناثیا، تریکوسترونژیولوس، کوپریا، نماتودریوس، استوفاگوسترم، چابریتا، بونوستوموم

- انگل‌های ریوی: گونه‌های دیکتیوکولوس

طیور: گونه‌های آسکاردیا و کاپیلاریا

موارد مصرف: لوامیزول ۷/۵% می‌تواند در موارد گاستروانتریت انگلی و بیماری‌های تنفسی انگلی ایجاد شده توسط مراحل نوزادی و بلوغ ارگانسیم‌های حساس به دارو استفاده شود.

موارد منع مصرف:

در صورت خوراندن بیش از دوز توصیه شده ممکن است علائمی همچون استفراغ، افزایش تنفس، افزایش ترشح بزاق، اشک، برآشفتنگی، لرزش عضلانی و سرفه مشاهده گردد.

نبایستی بطور همزمان و یا ۱۴ روز قبل و بعد از مصرف کلرامفنیکل - پیرانتل و سموم ارگانو فسفره تجویز گردد.

میزان و نحوه مصرف:

بصورت خوراکی با استفاده از درنچر و یا سرنگ بدون سر سوزن تجویز می‌گردد:

- گاو، گوسفند و بز: ۱ میلی‌لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن (معادل ۷/۵ میلی‌گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)

در گاوهای با وزن بیشتر از ۳۰۰ کیلوگرم به ازای هر ۱۰ کیلوگرم یک میلی‌لیتر و در گوسفندان باوزن بالاتر از ۶۰ کیلوگرم به ازای هر ۵ کیلوگرم ۰/۵ میلی‌لیتر بیشتر مصرف شود.

- طیور: ۲۵-۳۰ میلی‌گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین شود. برای اطمینان از محاسبه دوز صحیح دارو، بایستی وزن بدن تا حد امکان بصورت دقیق تعیین گردد. به دلیل نزدیک‌بودن دوز سمی و دوز درمانی، بیشتر از میزان توصیه‌شده مصرف گردد.

محلول درمانی بایستی بصورت تازه روزانه تهیه و در عرض ۲۴ ساعت مصرف گردد. در طول دوره درمان باید تنها منبع آب آشامیدنی، آب حاوی دارو باشد. میزان دوز مصرفی محلول‌های خوراکی یا پودرهای محلول در آب بسته به میزان آب مصرفی می‌تواند تحت تاثیر عواملی مانند دمای محیط (در فصول مختلف گرم و سرد)، محتوای نمک در غذا، وضعیت سلامت گله، تراکم، کیفیت و نوع آب مصرفی قرار گیرد. پس از باز کردن بطری، محتویات باید ظرف ۳۰ روز مصرف شود.

زمان پرهیز از مصرف: ۵

دام: شیر ۳ روز، گوشت ۱۲ روز و طیور ۳ روز قبل از کشتار.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام مصرف دارو حتما از دستکش و ماسک استفاده نمایید و در صورت تماس با چشم با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود.

مدت زمان نگهداری: ۲ سال پس از تاریخ تولید.

بسته بندی: بطری‌های پلی‌اتیلنی ۱ لیتری، ۵۰۰ و ۲۵۰ میلی‌لیتری.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)