



لینکومایسین ۸/۸٪

آمیرافید ۸/۸[®]

آنتی‌بیوتیک / پودر مخلوط در دان

ترکیب: هر کیلوگرم حاوی:

لینکومایسین (هیدروکلراید) ۸/۸ گرم
مواد جانبی و حامل تا ۱۰۰۰ گرم

گونه هدف: طیور گوشتی

مکانیسم اثر:

لینکومایسین یک آنتی‌بیوتیک باکتریواستاتیک از گروه لینکوزامیدها است که با اتصال به تحت واحد ۵۰S ریبوزومی مانع سنتز پروتئین های باکتری می‌شود و با مکانیسم فوق بر روی باکتری‌های گرم مثبت مانند: استرپتوکوک‌ها، استافیلوکوک‌ها، کلسترییدیوم‌ها و مایکوپلاسماها موثر می‌باشد.

موارد مصرف:

جهت کنترل ورم روده نکروتیک ناشی از کلسترییدیوم پرفریژنس و سایر میکروارگانیسم‌های حساس به آن، کمک به رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در نیمچه‌های گوشتی و کنترل CRD به کار می‌رود.

موارد منع مصرف: در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون استفاده نشود.

میزان و نحوه مصرف:

جهت ورم روده نکروتیک، کنترل CRD و بهبود میزان رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی:
۵۰۰ گرم در هر تن خوراک (از هفته اول پرورش جوجه‌های گوشتی تا انتهای دوره)

توجه: مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک تعیین گردد. برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت توصیه می‌شود ابتدا پرمیکس لینکومایسین ۸/۸ را براساس میزان دوز تجویز شده به ترتیب با ۱۰ کیلوگرم خوراک در ادامه با ۱۰۰ کیلوگرم خوراک و در نهایت با ۱۰۰۰ کیلوگرم خوراک به دقت مخلوط نموده تا مخلوط یکنواختی به دست آید.

تداخل دارویی:

مصرف هم زمان با اریترومایسین و تایلوزین توصیه نمی‌شود. لینکومایسین ۸/۸٪ سازگار با کلیه کوکسیدیواستات‌ها و محرک‌های رشد می‌باشد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

موارد احتیاط: این دارو فقط مصرف دامپزشکی دارد. دارو دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در هنگام تهیه مخلوط حتما از لباس‌های محافظ، دستکش غیر قابل نفوذ، عینک ایمنی و ماسک ضد گردوغبار استفاده نمایید و در صورت تماس با چشم‌ها با آب فراوان شستشو داده شود.

شرایط نگهداری: در مکان خشک و خنک، دمای بین ۲۵ - ۱۰ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم نور آفتاب و در ظروف در بسته اصلی نگهداری شود. **مدت زمان نگهداری:** ۲ سال پس از تاریخ تولید. **بسته بندی:** پاکت آلومینیومی ۵ کیلوگرمی.

آزمایشگاه‌های تولیدی

داروسازان ایران

(سهامی خاص)